

Mogipen®

USO VETERINÁRIO

(associação de 3 penicilinas + estreptomicina)

ANTIBIÓTICO INJETÁVEL DE LARGO ESPECTRO

FÓRMULA: Cada frasco-ampola com 8,3 g contém:

Benzilpenicilina benzatina (1187 UI/mg)..... 3.000.000 UI
Benzilpenicilina procaína (1000 UI/mg)..... 1.500.000 UI
Benzilpenicilina potássica (1580 UI/mg)..... 1.500.000 UI
Estreptomicina base (sulfato) (750 mcg/mg)..... 2.500 mg

Cada frasco-ampola é acompanhado de 1 ampola contendo 15 mL de diluente estéril.

INDICAÇÕES

Mogipen é indicado no controle das seguintes infecções por microorganismos sensíveis à penicilina, especialmente nos seguintes casos:

ESPÉCIES: BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS

PATOLOGIAS:	CAUSADAS POR:
Pneumonias Septicemia hemorrágica Outras infecções respiratórias Pneumoenterites (batedeira)	Klebsiela spp. Shigella spp. Pasteurella multocida Salmonela spp.
Abscessos Artrites Infecções piogênicas decorrentes de ferimentos acidentais ou cirurgias (castrações, cesariana, etc.)	Corynebacterium pyogenes Streptococcus spp. Staphylococcus spp.
Mastites e metrites	Streptococcus spp. Staphylococcus spp.
Leptospirose	Leptospira spp.
Actinomicose	Actinomyces bovis
Hemoglobinúria bacilar	Clostridium haemolyticum
Hepatite necrótica infecciosa	Clostridium novyi
Edema maligno	Clostridium septicum
Tétano	Clostridium tetani

ESPÉCIE: EQUINOS

PATOLOGIAS:	CAUSADAS POR:
Pneumonias Outras infecções respiratórias Pneumoenterites Septicemia hemorrágica	Klebsiela spp. Shigella spp. Pasteurella multocida Salmonela spp.
Artrites Abscessos Infecções piogênicas decorrentes de ferimentos acidentais ou cirurgias (castrações, cesariana, etc.)	Corynebacterium pyogenes Streptococcus spp. Staphylococcus spp.
Garrotilho ou adenite equina	Streptococcus equi
Tétano	Clostridium tetani
Epidermite exudativa	Staphylococcus spp.

Em todas as espécies, Mogipen é eficaz como profilático das infecções secundárias decorrentes de feridas acidentais ou cirúrgicas.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

Mogipen deve ser administrado em todas as espécies constantes das indicações, na dose de 1 a 3 mL do produto reconstituído para cada 50 kg de massa corporal, ou seja, 8.000 a 24.000 UI de penicilina e 3,3 a 10 mg de estreptomicina por Kg de peso, a critério do Médico Veterinário. Geralmente uma só injeção é suficiente para se atingir a cura, porém caso seja necessário, recomenda-se, todavia a continuidade do tratamento por um período não inferior a 48 horas após o desaparecimento do quadro clínico.

PRECAUÇÕES

Seguir as regras usuais de assepsia para preparação e administração do produto, desinfetando-se previamente a tampa do frasco e a região da injeção. Não tratar animais sabidamente alérgicos ao produto. Verificar a função renal durante o tratamento, principalmente em animais jovens. Após a reconstituição o produto deverá ser usado imediatamente ou conservado em geladeira por até 24 horas.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

Animais hipersensíveis poderão apresentar reações alérgicas ou anafiláticas, de gravidade variável, com sintomas de salivação, tremores, vômitos, respiração difícil e edema cutâneo em algumas áreas do corpo. Recomenda-se usar epinefrina, se necessário. Em suínos de engorda, durante situações de estresse, podem eventualmente ser observados febre transitória, vômitos, incoordenação motora, tremores e apatia.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Não associar o produto com antibióticos bacteriostáticos e outros aminoglicosídeos, pentobarbital e anestésicos inalatórios, relaxantes neuromusculares, diuréticos, heparina, gluconato de cálcio, riboflavina, triancinolona, fenibutazona e salicilatos.

TOLERÂNCIA

A combinação antimicrobiana possui boa tolerância nas espécies para as quais está indicada. Casos de intoxicação acidental são muito raros. Após uma sobredosagem poderão ser observados sintomas como deficiência respiratória e perda de consciência. Em casos extremos o animal poderá chegar a morte por falência respiratória e depressão vasomotora. Ao observar sintomas de intoxicação, suprimir a administração dos medicamentos e aplicar anti-histamínicos.

CONTRAINDICAÇÃO

O produto é contraindicado para animais com hipersensibilidade a penicilinas e/ou aminoglicosídeos bem como animais com hepatopatias, cardiopatias, insuficiência renal, com lesões cocleovestibulares ou com idade inferior a um mês. Não administrar em fêmeas gestantes.

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 05 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO. SUÍNOS E EQUINOS:

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 30 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE

02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO

Frasco-ampola contendo 8,3 g, acompanhado de ampola de diluente contendo 15 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 7.489 em 05/10/00. Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO

Bimeda Brasil S.A
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421
Monte Mor/SP – CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

FABRICANTE

Jofadel Indústria Farmacêutica S/A
Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, nº 100
Varginha/MG – CEP 37062-500
CNPJ 17.843.582/0001-70

INDÚSTRIA BRASILEIRA

