

# Bimectin®

USO VETERINÁRIO

**(Ivermectina a 1%)**



## SOLUÇÃO INJETÁVEL

**Endectocida injetável à base de ivermectina para uso em bovinos.**

**FÓRMULA:** Cada 100 mL contém:

Ivermectina.....1,00 g  
Veículo.....q. s. p.....100,00 mL

**INDICAÇÕES:** **Bimectin** é um endectocida indicado no tratamento e controle de parasitos internos e externos dos bovinos: Vermes gastrintestinais (adultos): **Haemonchus placei**, **Cooperia punctata**, **Oesophagostomum radiatum**, **Trichuris discolor**.

Bernes: larvas de **Dermatobia hominis**

Carrapatos: **Boophilus microplus** ( Adulto )

\* Ivermectina auxilia o controle destes parasitos quando usado como parte de um programa contínuo.

**MODO DE USAR:** **Bimectin** deve ser administrado somente por injeção subcutânea nas doses recomendadas.

**Bovinos:** 1 mL para 50 kg de peso por via subcutânea, o que equivale a 0,2 mg/kg de peso.

### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 19 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA O CONSUMO HUMANO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

### PRECAUÇÕES:

A segurança do produto não foi avaliada em animais gestantes ou em reprodução. Não administrar nestes animais. **Bimectin** é um produto seguro quando utilizado de acordo com as recomendações da bula. No caso de intoxicação por superdosagem poderá ocorrer incoordenação, paralisia, coma e morte do animal. Não existe antídoto conhecido e considerado completamente eficaz. Entretanto alguns estudos têm demonstrado que a picrotoxina, um antagonista do GABA, reverte o bloqueio do estímulo nervoso induzido pela Ivermectina. Em casos menos agudos o tratamento de apoio dá lugar a uma recuperação completa.

Não coma, não beba e na fume durante o manuseio do produto.

Não manuseie o produto com as mãos desprotegidas.

Não contamine coleções de água de qualquer natureza.

Descartar as embalagens vazias e restos de produto, bem como lavar os equipamentos usados de forma segura, evitando a contaminação do meio ambiente.

**PRAZO DE VALIDADE:** 02 (dois) anos após a data de fabricação.

Após a perfuração do selo, utilizar o produto em até 60 dias.

**APRESENTAÇÕES:** Frasco plástico contendo 50 mL, 250 mL, 500 mL e 1 L.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob nº 6.600 em 11/11/1998. Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira - CRMV-SP nº 9010 S

### PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421

Monte Mor/SP – CEP 13190-000

CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

 **Bimeda®**