

Prazifen[®]

USO VETERINÁRIO

(Praziquantel, Pamoato de Pirantel e Febantel)



VERMÍFUGO DE LARGO ESPECTRO PARA CÃES E GATOS

Sabor Fígado

FÓRMULA: Cada comprimido de 800mg contém:
Praziquantel.....50,00 mg
Pamoato de Pirantel*.....145,00 mg
Febantel.....150,00 mg
Excipiente..... q.s. p.....800,00 mg
*Equivalente a 50,35 mg da base

INDICAÇÃO:

Prazifen está indicado para controle das infestações causadas por nematódeos (helmintos) e cestódeos (tênias) que infestam os cães e gatos:

Toxocara canis
Toxascaris leonina
Ancylostoma tubaeforme
Uncinaria stenocephala
Echinococcus granulosus
Dipylidium caninum
Taenia pisiformis
Taenia taeniaeformis
Trichuris vulpis

Toxocara cati
Ancylostoma caninum
Ancylostoma brasiliense
Mesocostoides spp
Echinococcus multilocularis
Taenia ovis
Taenia multiceps
Taenia hydatigena
Joyeuxiella pasqualei

MODO DE USAR:

Prazifen deve ser administrado por via oral diretamente na boca do animal ou misturado à ração ou ao alimento, não sendo necessário jejum prévio ou regime alimentar, pois apresenta sabor de fígado.

POSOLOGIA:

O esquema abaixo fornece as doses recomendadas para as diversas faixas de peso do animal:

CÃES:

Cães com até 2,5 Kg: ¼ de comprimido.
Cães de 2,5 a 5 Kg: ½ comprimido.
Cães de 5 a 10 Kg: 1 comprimido
Para cães acima de 10 Kg administrar 1 comprimido para cada 10 Kg.

GATOS:

¼ de comprimido para cada 2 Kg de peso.
Recomenda-se o tratamento da fêmea antes da cobertura e 10 dias antes do parto.
Os filhotes podem ser tratados após o desmame, com 4, 8 e 12 semanas, e aos 4, 5 e 6 meses. Pode vermifugar a cadela ao mesmo tempo que a ninhada. Os adultos podem ser vermifugados a cada 3 meses.

PRECAUÇÕES E EFEITOS COLATERAIS:

Prazifen não possui contra-indicação, nem produz efeitos colaterais, nas dosagens recomendadas.

Observações:

Para combater reinfestações de *Dipylidium caninum*, que tem a pulga como hospedeiro intermediário, utilize o tratamento integrado de combate às pulgas.
No caso de *Ancylostoma caninum*, cada adulto ingere cerca de 0,1 mL de sangue por dia, e infestações severas costumam ser fatais para os filhotes. As larvas deste verme passam pela glândula mamária ao leite; penetram pela pele ou são ingeridas a partir de ambientes contaminados.
Já os *Toxocara canis* infestam os filhotes atravessando a barreira placentária; chegando ao leite através da glândula mamária ou pela ingestão de ovos. A cadela pode eventualmente adquirir vermes ingerindo aves ou roedores. Larvas destes últimos vermes permanecem inativas na musculatura da cadela, produzindo infestações por diversas crias consecutivas.
Junto com a vermifugação deve ser feita a limpeza rigorosa do ambiente com produtos a base de cloro ativo, efetivos contra larvas e ovos dos vermes.

PRAZO DE VALIDADE:

02 (dois) anos após a data de fabricação.

APRESENTAÇÃO:

Cartucho com 04 comprimidos de 800mg cada em envelopes aluminizados.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C) ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8831 em 07/04/04.
Responsável Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira - CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO:

Bimeda Brasil S.A.
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421
Monte Mor/SP CEP 13190-000
CNPJ 00.328.741/0001-04
SAC 0800 555408
www.bimeda.com.br

FABRICANTE:

Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.
Rua João Augusto Cirelli, nº 640.
Descalvado/SP - CNPJ 50.472.547/0001-68

INDÚSTRIA BRASILEIRA

 **Bimeda[®]**